

# Dr. Fernando Lopez Piñero

Médico especialista en Oncología Clínica  
Cuidados paliativos / Tratamiento del dolor  
MN 132.507 - MP 4.680

## Hospital de día Oncología Protocolo de Infusión

Nombre y apellido: DE LA LLAMA ARGENTINO

D.N.I.: 7.816.563

F.N.: 20/10/1946

Edad: 77 años

Cobertura Médica: PAMI

N° afiliado: 15014403350000

Diagnóstico: Cáncer de colon izquierdo (Kras No mutado) Estadio: IV

Peso: 91 kg	Talla: 1059 cm	Sc: 1.9 m2	Ecog: 0
-------------	----------------	------------	---------

Estrategia terapéutica: FOLFIRI + PANITUMUMAB

Esquema:

Código de práctica:

Lugar de aplicación: Hospital de día hemato-oncología Clínica del Valle

Fecha: 1/10/2024	N° ciclo: 5	Día:	Semana:
------------------	-------------	------	---------

Indicaciones:

1. Paracetamol 500 mg v.o.
2. Panitumumab (6 mg/kg) 500 mg / 100 cc SF en 60 min. i.v.
3. La infusión nunca debe ser mayor a 10 ml/minuto. Utilizar filtro de 0,22  $\mu$ metros.
4. Lavar la vena con 250 cc SF al finalizar la infusión.
5. En caso de reacción alérgica interrumpir la infusión y avisar al médico.
6. Ondansetron 8 mg + Dexametasona 8 mg / 100 cc SF en 15 minutos i.v.
7. Irinotecan (100 mg/m<sup>2</sup>) 200 mg / 500 cc Dext 5 % en 90 minutos i.v.
8. Leucovorina (200 mg/m<sup>2</sup>) 380 mg / 500 cc Dext 5 % en 2 horas i.v., en paralelo con iriotecan. (lavar con SF 100 ml antes de iniciar fluorouracilo)
9. Fluoruracilo (400 mg/m<sup>2</sup>) 760 mg/ 100 cc SF en goteo libre i.v.
10. Fluoruracilo (2400 mg/m<sup>2</sup>) 4500 mg en reservorio de 100 cc SF, infusión por bomba infusión ambulatoria de 46 horas.

Si el paciente presenta diaforesis, dolores cólicos abdominales o diarrea durante la infusión, suspender la misma y administrar Atropina 0,5 mg i.v.

Dar indicaciones de Loperamida en caso de diarrea

Firma y sello



Dr. Lopez Piñero Fernando  
ONCOLOGO CLINICO  
M.N 132.507 - M.P 4.680